



**Praxisklinik
für Oralchirurgie
und Implantologie**

Dr. Marcus Paarsch
Fachzahnarzt Oralchirurgie
MSc. Implantology

■ Patient/in

■ Behandlung

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 3-D Volumetomographie | <input type="checkbox"/> Rezessionsdeckung |
| <input type="checkbox"/> Extraktion/Osteotomie | <input type="checkbox"/> plastische Deckung |
| <input type="checkbox"/> Mikro-WSR mit retrograder WF | <input type="checkbox"/> Zystektomie |
| <input type="checkbox"/> Mikro-WSR mit orthograder WF | <input type="checkbox"/> präprothetischer Eingriff |
| <input type="checkbox"/> chirurgische Zahnfreilegung | <input type="checkbox"/> Exzision/Histologie |
| <input type="checkbox"/> Implantation/Augmentation | <input type="checkbox"/> Inzision |
| <input type="checkbox"/> chir. PAR-Behandlung | <input type="checkbox"/> Narkosebehandlung |
| <input type="checkbox"/> gesteuerte Geweberegeneration
(GTR) | <input type="checkbox"/> Myoarthropathie/Schmerz-
behandlung |

■ Spezifikation/Sonstiges

■ Friedrichstraße 12–18
72555 Metzingen

Telefon 0 71 23/93 4105
Telefax 0 71 23/93 4106

praxis@mundwerk-metzingen.de
www.mundwerk-metzingen.de

┌
Stempel/Unterschrift
└



Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,

Ihr Zahnarzt hat Sie bereits darüber informiert, warum ein operativer Eingriff notwendig ist. Über den genauen Ablauf sprechen wir bei einem Beratungstermin in unserer Praxisklinik. Für die OP erhalten Sie dann einen gesonderten Termin. Bitte beachten Sie folgendes:

- Bringen Sie vorhandene Unterlagen (Röntgenbilder, Medikamentenliste, Arztbriefe) mit.
- Vor einer Vollnarkose müssen Sie nüchtern sein. Bitte 8 Stunden vorher nicht essen, trinken oder rauchen.
- Fast jeder Eingriff lässt sich heute mit örtlicher Betäubung völlig schmerzfrei durchführen. Vor einer örtlichen Betäubung können Sie ganz normal essen.
- Nach dem Eingriff dürfen Sie nicht Auto fahren. Bitte abholen lassen.
- Bitte 3-4 Stunden nach dem Eingriff nicht essen und trinken.
- Um einer möglichen Schwellung der Wange vorzubeugen, sollten Sie die Wange etwa zwei Tage lang kühlen (z.B. mit Eisbeutel).
- Nach dem Eingriff sind Sie evtl. 1-2 Tage arbeitsunfähig. Bitte besprechen Sie dies vorher mit Ihrem Arbeitgeber.